

## Подготовка к колоноскопии с помощью препарата **Пикопреп**

Подготовка может быть 3 видов в зависимости от того, когда планируется проведение колоноскопии. При этом при любой схеме приема раствор на основе Пикопрепа готовится одинаково - 1 пакетик нужно растворить в 150мл теплой негазированной воды.

Одноэтапная - Если исследование проводится с 07:00 до 10.00. В день накануне колоноскопии в промежуток времени с 16:00 до 18:00 необходимо принять первую дозу препарата, затем употребить не менее 5 стаканов по 250мл прозрачной жидкости из расчета 1 стакан в час или по переносимости. С 22:00 до 24:00 нужно принять вторую дозу препарата и не менее 3 стаканов жидкости по такому же правилу.

Двухэтапная - Если исследование проводится с 10:00 до 15.00. В день накануне колоноскопии в промежуток времени с 19:00 до 21:00 необходимо принять первую дозу препарата, затем употребить не менее 5 стаканов по 250мл прозрачной жидкости из расчета 1 стакан в час или по переносимости. В день колоноскопии с 05:00 до 07:00 нужно принять вторую дозу препарата и не менее 3 стаканов жидкости по такому же правилу. Прекратить прием жидкости не позднее трех часов до процедуры.

Если исследование проводится с 15:00 до 19.00. В день накануне колоноскопии в промежуток времени с 19:00 до 21:00 необходимо принять первую дозу препарата, затем употребить не менее 5 стаканов по 250мл прозрачной жидкости из расчета 1 стакан в час или по переносимости. В день колоноскопии с 08:00 до 10:00 нужно принять вторую дозу препарата и не менее 3 стаканов жидкости по такому же правилу. Прекратить прием жидкости не позднее трех часов до процедуры.